

Kiebitz NN

Raný chipsový brambor



1. Způsob použití

Kiebitz je raná až poloraná chipsová odrůda s obzvláště vysokou stabilitou kvality pro výrobu chipsů. Má velmi dobré vlastnosti pro zpracování jak přímo po sklizni, tak i po dlouhodobém skladování při teplotě do 4°C.

2. Konzumní hodnota

Tvarově velmi vyrovnaný chipsový brambor, s pevnou mechanickému poškození odolnou slupkou. Obsah škrobu je v průměru 19 %.

3. Vlastnosti hlíz

Tvar hlíz:	krátce oválný	Očka:	středně hluboká
Velikost hlíz:	středně velká	Slupka:	síťovaná
Nasazení hlíz:	střední	Barva dužniny:	žlutá
Výnos hlíz:	malý – střední	Třídění:	velmi vyrovnané

4. Odolnost proti

Hád'átku:	Ro1, 4	Rakovině:	D1
Černání stonku:	střední	Hnilobě hlíz:	vysoká
Y – viru:	středně vysoká	Plísni natě:	střední
Strupovitosti:	středně vysoká	Rzivosti dužniny:	vysoká
Svinutce:	střední	Vločkovitosti:	vysoká

5. Vegetační znaky

Plynulý vývoj v raném stádiu, trs středně vysoký až vysoký, červenofialová barva květů, střední až vysoká četnost květů.

6. Skladovací vlastnosti:

Velmi dobrá skladovatelnost, velmi dlouhý vegetační klid.

Doporučení pro pěstování:

Obsah škrobu a cukru není u odrůdy Kiebitz obecně významný problém, ale spíš úroveň výnosu. Pro jeho dosažení je zapotřebí zabránit jakémukoliv stresu během vegetace.

Proto:

A) Protože má Kiebitz velice dlouhý vegetační klid (dormanci) musí být před výsadbou bezpodmínečně **stimulován ke klíčení** (minimálně narašit očka má velký efekt). Jinak se vzcházení zpomalí. To může mít další negativní důsledky, co se týče možnosti napadení vložkovitostí – černá noha, atd. a znamená to ztrátu disponibilní vegetační doby.

B) Před vzcházením **je nutné velice opatrně pracovat se Sencorem a po vzejtí už by se neměl použít**. Kiebitz nevykazuje sice žádné zřetelné poškození **postřikem** při použití Sencoru, ale přesto **výrazně reaguje zpomalením růstu**. To opět znamená ztrátu vegetačního potenciálu. Pokud možno, by se měly používat alternativní herbicidy.

C) Obzvláště důležité je **dobré zpracování půdy**. Základ hrůbku je třeba mít, pokud možno hluboko proto, že tato odrůda, když nemá, jak se říká „*měkké lůžko*“, roste nahoru. Problém, který vzniká, jsou zelené hlízy rostoucí na povrch hrůbku. (velmi mu prospívá nahrnutí). *Mírně hlubší sázení*, spojené s vytvořením co největšího hrůbku je důležité. Kiebitz je odrůda, která vzchází pomaleji, proto **je hloubka sázení důležitá**. Je třeba dbát, *aby sadba nebyla na počátku hluboko „pohřbena“ pod příliš studenou a vlhkou půdou*. Je lépe se sázením počkat a zasázet do prohřáté půdy.

D) **Podpora listového aparátu** pomocí listového hnojení se stopovými prvky (Zinek, Mangan) během stresových fází vegetace (sucho a horko – použít větší množství vody při aplikaci jakéhokoliv přípravku, s doplněním o mikroelementy).

Kiebitz je raná odrůda a existuje nebezpečí, že v takovýchto fázích nať „polehne“ a už se nezvedne. To zase znamená ztrátu vegetační doby pro dosažení dobrého výnosu.