

Birte NN

Raná konzumní odrůda brambor varného typu B



1. Způsob použití

Birte je raná konzumní odrůda brambor s převážně pevným varem, varný typ B. Jako kvalitní konzumní brambor spojuje **Birte** mimořádně nízký sklon k zabarvování za syrova a tmavnutí při varu s tmavožlutou barvou dužiny a velmi dobrou chutí. **Birte** se doporučuje k mnohostrannému použití při dalším zpracování brambor a při uplatnění na trhu konzumních brambor.

2. Konzumní hodnota

převážně pevný typ varu (varný typ B), velice nepatrné až žádné zabarvení za syrova a jen velmi malé zabarvení po uvaření, velmi dobrá chuť, obsah škrobu cca. 12 %, výborně se hodící pro loupání.

3. Vlastnosti hlíz

Tvar hlízy:	krátce oválný	Výnos hlíz:	střední až vysoký
Nasazení hlíz:	střední až vysoké	Velikost hlízy:	střední
Slupka:	hladká až síťovaná	Hloubka oček:	mělká
Barva dužiny:	tmavě žlutá	Třídění:	vyrovnané

4. Odolnost proti

Hád'átku:	Ro1,4	Strupovitosti:	střední až vysoká
Černání stonku:	velmi vysoká	Y - viru:	velmi vysoká
Svinutce:	střední až vysoká	Hnilobě hlíz:	střední
Hnilobě natě:	střední	Vločkovitosti:	velmi vysoká
Rzivosti dužiny:	velmi vysoká		

5. Vegetační znaky

Plynulý vývoj mladé rostliny, polovzpřímený tvar trsu, středně vysoký, barva květů bílá, velmi malá četnost květů.

6. Skladovací vlastnosti

Velmi dobrá skladovatelnost, střední vegetační klid.

Doporučení:

Hnojení při očekávaném výnosu 50 t/ha:

N 150-170 kg/ha včetně Nmin. (na lehkých a zavlažovaných půdách rozdělit dávku), P₂O₅ 80-100 kg/ha, K₂O 230-270 kg/ha (bez Cl, na lehkých a zavlažovaných půdách rozdělit dávku), MgO 80-90 kg/ha

Lehké půdy: vzdálenost hlíz v řádku 30 cm při rozteči 75 cm,
44 000 hlíz / ha při standartním tříděním

Těžké půdy: vzdálenost hlíz v řádku 26 cm při rozteči 75 cm,
51 000 hlíz / ha při standartním tříděním