

Goldmarie NN

Raná konzumní odrůda brambor s pevným varem



1. Způsob použití

Goldmarie je raná, výnosná, salátová odrůda s pevným varem a s vynikající konzumní hodnotou.

2. Konzumní hodnota

Hlízy se díky svému oválnému tvaru a vynikající chuti výborně hodí na saláty. Svojí žlutou až tmavožlutou barvou dužniny a velice nepatrným tmavnutím během varu jsou vhodné rovněž pro přímý konzum i pro výrobu polotovarů. Obsah škrobu je v průměru 13%. **Varný typ A.**

3. Vlastnosti hlíz

Tvar hlíz:	dlouze oválný	Očka:	velmi mělká
Velikost hlíz:	středně velké	Slupka:	hladká až síťovaná
Nasazení hlíz:	střední	Třídění:	vyrovnané
Výnos hlíz:	vysoký	Barva dužniny:	žlutá až tmavožlutá

4. Odolnost proti

Háďátka:	Ro1, Ro4	Černání stonku:	vysoká
Hnilobě hlíz:	velmi vysoká	Plísní natě:	střední až vysoká
Rzivosti dužniny:	vysoká	Y - viru:	vysoká
Strupovitosti:	vysoká	Svinutce:	střední až vysoká
Vločkovitosti:	vysoká		

5. Vegetační znaky

Jakožto odrůda se značně hlubokým vegetačním klidem vzchází **Goldmarie** spíše opatrně a v raném stádiu má pomalý vývoj. Úspěšnému pěstování této odrůdy napomáhá včasné naklíčení před výsadbou. Trs je střední až vysoký, barva květu bílá, četnost květů střední.

6. Skladovací vlastnosti

Velmi dobrá skladovatelnost, dlouhý vegetační klid.

Doporučení:

Hnojení při očekávaném výnosu 50 t/ha:

N 60-90 kg/ha včetně Nmin. (na lehkých a zavlažovaných půdách rozdělit dávku), P₂O₅ 60-80 kg/ha, K₂O 300-350 kg/ha (2/3 před výsadbou s Cl, 1/3 po zapojení porostu bez Cl), MgO 80-100 kg/ha

Lehké půdy: vzdálenost hlíz v řádku 32 cm při rozteči 75 cm,
42 000 hlíz / ha při standartním třídění

Těžké půdy: vzdálenost hlíz v řádku 30 cm při rozteči 75 cm,
44 000 hlíz / ha při standartním třídění