

Salome NN

Velmi raná konzumní odrůda brambor varného typu A/B



1. Způsob použití

Salome je velmi raná konzumní odrůda s pěkným tvarem a pevným varem s vynikající chutí. Hodí se rovněž velmi dobře pro průmyslovou výrobu bramborových salátů. Může se používat a uplatňovat na trhu jako velmi raná odrůda, ale i jako následná odrůda. Vynikající konzumní kvalitu salátového typu si uchovává i během skladování. **Salome** je velmi vhodná odrůda pro strojní loupání a dobře se myje.

2. Konzumní hodnota

Pevná konzistence po uvaření (varný typ A/B), nepatrný sklon k zabarvení po uvaření, velice dobrá chuť.

3. Vlastnosti hlíz

Tvar hlíz:	oválný	Hloubka oček:	mělká
Velikost hlíz:	střední - velká	Slupka:	hladká
Nasazení hlíz:	střední - vysoké	Výnos hlíz:	vysoký při dostatečném zavlažení
Barva dužniny:	žlutá	Třídění:	vyrovnané

4. Odolnost proti

Hád'átku:	Ro ₁ , Ro ₄	Plísni natě:	střední
Y-Viru:	velmi vysoká	Rzivosti dužniny:	velmi vysoká
Svinutce:	vysoká	Strupovitosti:	střední až vysoká
Vločkovitosti:	velmi vysoká	Černání stonku:	vysoká
Hnilobě hlíz:	vysoká		

5. Vegetační znaky

Střední vývoj v raném stádiu, rychlý nárůst natě, volný stonkovo-listový typ, trs polovzpřímený, bílá barva květů, četnost květů střední až vysoká.

6. Skladovatelnost

Dobrá skladovatelnost, velmi dlouhý vegetační klid.

Doporučení pro pěstování

1. Výběr stanoviště a zavlažování

Salome upřednostňuje střední půdy v dobrém agrotechnickém stavu s dostatečnou zásobou půdní vláhy. I v lehčích půdách lze při možnosti zavlažování a vyváženém hnojení dosáhnout vysokých výnosů kvalitních brambor. Pěstování pod folií vede k podstatnému posunutí termínu sklizně.

2. Sazení

Salome má pro ranou odrůdu výjimečně dlouhý vegetační klid. Je proto nezbytně nutné včasné a intenzivní naklíčení popř. kondicionování! Je vhodné provést moření proti vložkovitosti pro zajištění dobrého zdravotního stavu. **Salome** má střední až vysoké nasazení hlíz. Při vzdálenosti řádků 75 cm se doporučuje pro produkci salátových brambor vzdálenost sazení 28 cm, pro poněkud větší brambory vzdálenost 30-32 cm. Při dodržení normální hloubky sazení a kvůli minimalizaci podílu zelených hlíz je nutné dodržet dostatečnou výšku (cca. 35 cm) a šířku brázd (cca. 60 cm).

3. Hnojení

Při propočtu dávek hnojiva by měly sloužit jako podklad výsledky rozboru půdy a dávky by se měly měnit podle místních podmínek. Celková potřeba N je 150 - 170 kg/ha. Pro střední stupeň zásobení půd a očekávaný výnos cca. 40t/ha doporučujeme následující množství živin:

P ₂ O ₅	80-100 kg/ha
MgO	50-70 kg/ha
K ₂ O	190-240 kg/ha

4. Ochrana rostlin

Při chemickém boji proti plevelům je nutné mít na paměti, že **Salome** nesnáší **Sencor** a **Cato**. Je nutné sáhnout po jiných herbicidech, které se používají před vzejitím s velmi opatrným dávkováním. I u odrůdy **Salome** je nutný preventivní a včasný boj proti plísni natě.

5. Sklizeň a úprava

Vyžralé partie s pevnou slupkou, které byly šetrně sklizeny a upraveny, zajišťují vysokou kvalitu a dobré odbytové šance i u umytého a baleného zboží.