

Triton NNp

*Polopozdní odrůda pro výrobu škrobu s vysokou odolností vůči
hád'átkům a rakovině*



1. Způsob použití

Triton je **polopozdní** odrůda pro **výrobu škrobu**. Triton se vyznačuje **vysokými výnosy škrobu a vysokou odolností vůči hád'átkům a biotypům rakoviny**. Se **škrobnatostí nad 20%** a odolností vůči cystotvorným hád'átkům *Globodera pallida* je odrůda Triton vhodná do problematických lokalit. Rozšířená odolnost proti rakovinnému biotypu odrůdy Tritonu také podporuje udržitelné a odpovědné pěstování škrobových brambor.

2. Vlastnosti hlíz

Tvar hlíz:	krátce oválné	Hloubka oček:	střední
Velikost hlíz:	střední - velká	Slupka:	hrubá, tmavě žlutá
Nasazení hlíz:	střední - vysoké	Barva dužniny:	světle žlutá
Výnos hlíz:	vysoký	Třídění:	velmi vyrovnané
Výnos škrobu:	velmi vysoký		

3. Odolnost proti:

Hád'átku:	Ro1,4 a Pa3	Černání stonku:	vysoká
Hnilobě hlíz:	velmi vysoká	Plísni natě:	střední
Rzivost dužniny:	vysoká	Y-Viru:	velmi vysoká
Strupovitosti:	vysoká	Svinutce:	velmi vysoká
Rakovině:	D1, G1, O1, T1	Vločkovitost:	vysoká

4. Vegetační znaky:

Rychlé vzcházení a rychlý vývoj mladých rostlin, červená barva květenství, četnost kvetení vysoká.

5. Skladovací vlastnosti:

Dobrá skladovatelnost, dlouhý vegetační klid.

Doporučení:

Hnojení při očekávaném výnosu 50 t/ha:

N 160 kg/ha včetně Nmin. (na lehkých a zavlažovaných půdách rozdělit dávku), P₂O₅ 80-100 kg/ha, K₂O 250-300 kg/ha (bez Cl, na lehkých a zavlažovaných půdách rozdělit dávku), MgO 80-100 kg/ha,

Lehké půdy: vzdálenost hlíz v řádku 38 cm při rozteči 75 cm,
35 000 hlíz / ha při standartním třídění

Těžké půdy: vzdálenost hlíz v řádku 34 cm při rozteči 75 cm,
39 000 hlíz / ha při standartním třídění

